

# Práctica 4

## Números Complejos

**Ejercicio 1.** Dar la forma binómica de  $z$  en los casos

$$a) z = 1 - i(2 + i)$$

$$b) z = (1 + 2i)(3 - i)^2$$

$$c) z = (3 + 4i)^{-1}$$

**Ejercicio 2.** Hallar todos los números complejos  $z$  que satisfacen

$$a) (1 + i)z + 5 = 2 - 3i$$

$$b) i(z - 5) = (1 + 3i)z$$

$$c) \frac{z - i}{z} = 2 + i$$

$$d) \frac{2 + i}{z} = \frac{2 + 2i}{z + 1}$$

**Ejercicio 3.** Dar la forma binómica de todos los números complejos  $z$  que satisfacen

$$a) \bar{z}(z + 1) = 11 + 3i$$

$$b) \operatorname{Re}(z) \cdot \bar{z} = 4 + 6i$$

$$c) \operatorname{Im}(z) \cdot z + i \operatorname{Re}(z) \cdot \bar{z} = 2\operatorname{Re}(z) \cdot \operatorname{Im}(z)$$

**Ejercicio 4.** Dados  $z = 1 + 3i$  y  $w = 4 + 2i$ , representar en el plano, sin calcularlos, los números complejos  $\bar{z}$ ,  $-z$ ,  $2z$ ,  $-3w$ ,  $-\bar{w}$ ,  $z + w$ ,  $w - z$  y  $\bar{z} - 3w$ .

**Ejercicio 5.** Sabiendo que  $2 + 2i$ ;  $-2 + 2i$ ;  $-2 - 2i$  y  $2 - 2i$  son los vértices de un cuadrado de lados paralelos a los ejes cuyas diagonales se cortan en  $z = 0$ , hallar  $w_1, w_2, w_3, w_4 \in \mathbb{C}$  que sean los vértices de un cuadrado de lados paralelos a los ejes del mismo tamaño que el dado pero cuyas diagonales se corten en  $z = 3 + 5i$ .

**Ejercicio 6.** Calcular  $|z|$  en los casos

$$a) z = i(4 - 3i)$$

$$b) z = (1 + i)^8$$

$$c) z = \sqrt{5}(1 + 2i)^{-1} \overline{(1 + i)}$$

$$d) z = 1 - i(2 + i)$$

$$e) z = (-7i) |(1 - i)^{-1}|$$

$$f) z = \sqrt{2}(-1 + i)^{-1}(3 + i)^8$$



$$g) z = -3 \left( \cos \frac{17}{5} \pi + i \operatorname{sen} \frac{17}{5} \pi \right)$$

$$h) z = \cos \frac{7}{4} \pi - i \operatorname{sen} \frac{7}{4} \pi$$

$$i) z = 4 \left( \cos \frac{\pi}{3} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{3} \right)^{-1}$$

$$j) \cos \frac{\pi}{5} + i \cos \frac{\pi}{5}$$

**Ejercicio 13.** Representar en el plano complejo

$$a) \{z \in \mathbb{C} / 1 \leq |z| \leq 4 \text{ y } \arg(z) = \frac{\pi}{4}\}$$

$$b) \{z \in \mathbb{C} / |z - 1| = 3 \text{ y } 0 \leq \arg(z) \leq \frac{\pi}{3}\}$$

$$c) \{z \in \mathbb{C} / \operatorname{Re}(z) > \operatorname{Im}(z) \text{ y } \pi \leq \arg(z) \leq \frac{7}{4} \pi\}$$

**Ejercicio 14.** Hallar la forma trigonométrica de  $z$  en los casos

$$a) z = (1 + i) \left( \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} i \right)$$

$$b) z = (-3i)(-1 + i) \left( \cos \frac{\pi}{5} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{5} \right)$$

$$c) z = (-1 + \sqrt{3}i)^8 (2 + 2i)^{-1}$$

$$d) z = \left( \operatorname{sen} \frac{2\pi}{7} - i \cos \frac{2\pi}{7} \right)^5$$

**Ejercicio 15.** Hallar la forma binómica de  $z$  en los casos

$$a) z = (-\sqrt{3} + i)^{16} (1 - i)$$

$$b) z = \frac{-2i}{(1 + \sqrt{3}i)^{11}}$$

$$c) z = \frac{(\sqrt{3} + i)^{23}}{(-1 - i)^{31}}$$

$$d) z = 3 \left( \cos \frac{\pi}{5} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{5} \right)^{15}$$

**Ejercicio 16.** Hallar las raíces  $n$ -ésimas de  $w$  y expresarlas con la notación exponencial en los casos

$$a) n = 3, n = 4 \text{ y } n = 6, \quad w = 1$$

$$b) n = 6, \quad w = -1$$

$$c) n = 4, \quad w = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} i$$

$$d) n = 5, \quad w = i$$

$$e) n = 3, \quad w = 5 - 5i$$

$$f) n = 4, \quad w = -8 + 8\sqrt{3}i$$

**Ejercicio 17.** Determinar todos los  $z \in \mathbb{C}$  que satisfacen

$$a) z^6 = -1$$

$$b) z^3 = \overline{iz^2}$$

$$c) z^8 = \left( \frac{-1 + i}{\sqrt{3} + i} \right)^3$$

$$d) z^4 = -\overline{z^4}$$

$$e) z^3 + 4i|z| = 0$$

$$f) z^6 = (1 + 2i)^6$$

**Ejercicio 18.**

- a) Hallar los vértices de un hexágono regular inscripto en la circunferencia de centro  $z_0 = 0$  y radio 2 y que tiene a 2 como uno de sus vértices.
- b) Hallar los vértices de un hexágono regular que esté inscripto en la circunferencia de centro  $z_0 = 1 + i$  y radio 2.
- c) Hallar los vértices de un hexágono regular que esté inscripto en la circunferencia de centro  $z_0 = 1 + i$  y radio 4.
- d) Hallar los vértices del hexágono regular inscripto en la circunferencia de centro  $z_0 = 0$  y radio 2 que se obtiene rotando en sentido antihorario el hexágono hallado en a) en un ángulo  $\alpha = \frac{\pi}{4}$ .
- e) Hallar los vértices del hexágono regular inscripto en la circunferencia de centro  $z_0 = 0$  y radio 2 que tiene dos de sus vértices sobre el eje imaginario puro.
- f) Hallar los vértices del hexágono regular que tiene a  $w = 3 + 4i$  como uno de sus vértices y que está inscripto en una circunferencia de centro  $z_0 = 0$ .