

### Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1 sobre 1

1

🚩 Marcar pregunta

Sea  $y \in C^\infty(\mathbb{R})$  tal que  $y'' + 5y' - 14y = 0$ .

Seleccione una:

- a.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0 \iff [y(0) \ y'(0)]^T \in \text{gen} \{ [1 \ -2]^T \}$ .
- b.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0 \iff [y(0) \ y'(0)]^T \in \text{gen} \{ [1 \ -5]^T \}$ .
- c.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0 \iff [y(0) \ y'(0)]^T \in \text{gen} \{ [1 \ -7]^T \}$ . ✓
- d.  $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0 \iff [y(0) \ y'(0)]^T \in \text{gen} \{ [1 \ -3]^T \}$ .

La respuesta correcta es:  $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0 \iff [y(0) \ y'(0)]^T \in \text{gen} \{ [1 \ -7]^T \}$ .

### Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1 sobre 1

1

🚩 Marcar pregunta

Sean  $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$  y  $B \in \mathbb{R}^{3 \times 4}$  dos matrices tales que  $AB = \begin{bmatrix} -4 & 4 & 4 & 2 \\ -7 & 7 & 7 & 1 \\ 8 & -8 & -8 & 9 \end{bmatrix}$ ,

donde  $\text{rang}(A) = 3$ , y  $B$  satisface que

$$B \begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 9 \end{bmatrix}^T,$$

$$B \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 6 & 8 & 1 \end{bmatrix}^T.$$

El conjunto solución de la ecuación  $Bx = \begin{bmatrix} -4 & -7 & 8 \end{bmatrix}^T$  es ...

Seleccione una:

- a.  $\left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + a \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}$
- b.  $\left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix} + a \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}$
- c.  $\left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix} + a \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}$ . ✓
- d.  $\left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} + a \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}$ .

La respuesta correcta es:  $\left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix} + a \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}$ .

### Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1 sobre 1

1

🚩 Marcar pregunta

En  $\mathbb{R}^3$  con el producto interno  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  definido por

$$\langle x, y \rangle = y^T \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} x,$$

se considera la funcional lineal  $\phi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$  definida por

$$\phi(x) = 2x_1 + 5x_2 + 3x_3.$$

El único vector  $v \in \mathbb{R}^3$  tal que  $\phi(x) = \langle x, v \rangle$  para todo  $x \in \mathbb{R}^3$  es ...

Seleccione una:

- a.  $v = [-3 \ 5 \ 1]^T$ . ✓
- b.  $v = [1 \ 2 \ -1]^T$ .
- c.  $v = [-1 \ 5 \ -2]^T$ .
- d.  $v = [-4 \ 3 \ 4]^T$ .

## Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1 sobre 1

🚩 Marcar pregunta

Sea  $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  un  $\mathbb{R}$ -espacio euclídeo de dimensión 3, y sea  $\{v_1, v_2, v_3\}$  una base ortonormal de  $V$ .

La distancia del vector  $2v_1 + 5v_2$  al subespacio  $\text{gen}\{v_1 + 3v_2, 2v_1 + 3v_3\}$  es ...

Seleccione una:

- a.  $\frac{13\sqrt{14}}{14}$
- b.  $\frac{\sqrt{14}}{14}$  ✓
- c.  $\frac{9\sqrt{14}}{14}$
- d.  $\frac{11\sqrt{14}}{14}$

La respuesta correcta es:  $\frac{\sqrt{14}}{14}$

## Pregunta 7

Sin contestar

Puntúa como 1

🚩 Marcar pregunta

De acuerdo con la técnica de mínimos cuadrados, la recta que mejor ajusta los siguientes datos

$x$	-1	0	1	2	3
$y$	1	3	7	10	13

es ...

Seleccione una:

- a.  $y = \frac{1}{10}(37 + 31x)$
- b.  $y = \frac{1}{10}(41 + 29x)$
- c.  $y = \frac{1}{10}(41 + 33x)$
- d.  $y = \frac{1}{10}(42 + 30x)$

La respuesta correcta es:  $y = \frac{1}{10}(37 + 31x)$

## Pregunta 8

Incorrecta

Puntúa 0 sobre 1

🚩 Marcar pregunta

Sean  $U$  y  $S$  los subespacios de  $\mathbb{R}_3[x]$  definidos por

$U = \{p \in \mathbb{R}_3[x] : p'(3) = 0\}$  y  $S = \text{gen}\{1 - 6x + x^2, 2 - 27x + x^3\}$ .

Un subespacio  $T$  de  $\mathbb{R}_3[x]$  tal que  $S \oplus T = U$  es ...

Seleccione una:

- a.  $T = \text{gen}\{-9x^2 + 2x^3\}$
- b.  $T = \text{gen}\{9x^2 + 2x^3\}$
- c.  $T = \text{gen}\{-5 - 9x^2 + 2x^3\}$
- d.  $T = \text{gen}\{13 + 9x^2 + 2x^3\}$  ✗

La respuesta correcta es:  $T = \text{gen}\{-9x^2 + 2x^3\}$

## Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1 sobre 1

🚩 Marcar pregunta

Sea  $S_a \subseteq \mathbb{R}^{2 \times 2}$  el subespacio definido por

$S_a = \text{gen}\left\{\begin{bmatrix} -3 & a-5 \\ a-8 & -3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} a-2 & a-7 \\ a-7 & 0 \end{bmatrix}\right\}$ , con  $a \in \mathbb{R}$ .


Seleccione una:

- a.  $\dim(S_a) = 3$  si y solamente si  $a \notin \{3, 5\}$ .
- b.  $\dim(S_a) = 3$  si y solamente si  $a \notin \{5, 7\}$ .
- c.  $\dim(S_a) = 3$  si y solamente si  $a \notin \{2, 7\}$ .
- d.  $\dim(S_a) = 3$  si y solamente si  $a \notin \{2, 5\}$  ✓

Pregunta  
10

Correcta

Puntúa 1 sobre 1

 Marcar pregunta

Sea  $T : \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$  la simetría de  $\mathbb{R}_2[x]$  con respecto al subespacio  $\text{gen}\{x - x^2\}$  en la dirección del subespacio  $\text{gen}\{1 - 2x, 1 + x^2\}$ . La matriz de  $T$  con respecto a la base canónica  $\{1, x, x^2\}$  es ...

Seleccione una:


- a.  $\frac{1}{3} \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 4 & -1 & -4 \\ -4 & -2 & 1 \end{bmatrix}$  ✓
- b.  $\frac{1}{3} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -2 \\ -2 & -1 & 2 \end{bmatrix}$
- c.  $\frac{1}{3} \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -4 & 1 & 4 \\ 4 & 2 & -1 \end{bmatrix}$
- d.  $\frac{1}{3} \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

La respuesta correcta es:  $\frac{1}{3} \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 4 & -1 & -4 \\ -4 & -2 & 1 \end{bmatrix}$ .

Pregunta  
11

Correcta

Puntúa 1 sobre 1

 Marcar pregunta

Sea  $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}_2[x], \mathbb{R}^3)$  y sea  $[T]_B^C = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$  la matriz de  $T$  con respecto a las bases

$B = \left\{ \frac{1}{2}(x-1)(x-2), -x(x-2), \frac{1}{2}x(x-1) \right\}$  de  $\mathbb{R}_2[x]$  y  $C = \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$  de  $\mathbb{R}^3$ .

Si  $S = \text{gen}\{1 - x, 1 + x\}$ , entonces ...

Seleccione una:

- a.  $T(S) = \text{gen} \left\{ \begin{bmatrix} -3 \\ 10 \\ 8 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -6 \\ 11 \\ 10 \end{bmatrix} \right\}$  ✓
- b.  $T(S) = \text{gen} \left\{ \begin{bmatrix} 11 \\ 18 \\ 10 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 15 \\ 23 \\ 13 \end{bmatrix} \right\}$
- c.  $T(S) = \text{gen} \left\{ \begin{bmatrix} 7 \\ 12 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 9 \\ 14 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$
- d.  $T(S) = \text{gen} \left\{ \begin{bmatrix} 7 \\ 2 \\ 12 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 9 \\ 1 \\ 14 \end{bmatrix} \right\}$

La respuesta correcta es:  $T(S) = \text{gen} \left\{ \begin{bmatrix} -3 \\ 10 \\ 8 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -6 \\ 11 \\ 10 \end{bmatrix} \right\}$ .