

# Episodio 17

## Autovalores y Autovectores. Primera Parte.

Departamento de Matemática  
FIUBA

# Autovalores y autovectores de matrices y transformaciones lineales

Vamos a trabajar con matrices cuadradas,  $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$  y con endomorfismos  $T : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}$ .

Tanto si trabajamos con matrices, como si trabajamos con transformaciones lineales nos puede interesar encontrar las "rectas", direcciones, que permaneces invariantes.

Esto quiere decir que buscaremos los vectores  $v$  en  $\mathbb{K}^n$  o en  $\mathbb{V}$  (según estemos trabajando con una matriz o una t.l.), no nulos, tales que:

$Av = \lambda v$ . o en el caso de la t.l.  $T(v) = \lambda v$ , donde  $\lambda \in \mathbb{K}$

$A \in \mathbb{K}^{n \times n}, X_0 \in \mathbb{K}^n.$

Muchas veces nos encontramos con sucesiones en  $\mathbb{K}^n$  :

$$X_1 = AX_0.$$

$$X_2 = AX_1 \implies X_2 = A^2X_0.$$

$$\vdots = \vdots$$

$$X_n = AX_{n-1} \implies X_n = A^nX_0.$$

Si queremos anticipar el comportamiento de la sucesión para valores grandes de  $n$ , tenemos que tener una idea del comportamiento de las potencias de la matriz  $A$ .

Calcular la potencia  $n$ -ésima de una matriz  $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$  suele ser engorroso.

Las matrices cuadradas en las que es más sencillo calcular las distintas potencias naturales, son las matrices diagonales, a las que en general notamos como  $D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ .

$$D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{bmatrix}$$

Es fácil verificar que entonces,  $D^k = \text{diag}(\lambda_1^k, \lambda_2^k, \dots, \lambda_n^k)$

Otro caso no tan sencillo como este, pero sí mucho más sencillo que el general, es el de las matrices  $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$  que pueden factorizarse en la forma:

$A = Q D Q^{-1}$  con  $Q$  una matriz inversible y

$D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ .

Pues, si  $A = Q D Q^{-1}$ :

$$A^2 = A \cdot A = Q D (Q^{-1} Q) D Q^{-1} = Q D^2 Q^{-1}$$

$$A^3 = A \cdot A \cdot A = Q D Q^{-1} Q D Q^{-1} Q D Q^{-1}$$

$$A^3 = A \cdot A \cdot A = Q D (Q^{-1} Q) D (Q^{-1} Q) D Q^{-1} = Q D^3 Q^{-1}$$

En general entonces, si  $n \in \mathbb{N}$ :

$$A = Q D Q^{-1} \implies A^n = Q D^n Q^{-1}$$

Otro caso no tan sencillo como este, pero sí mucho más sencillo que el general, es el de las matrices  $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$  que pueden *factorizarse* en la forma:

$A = Q D Q^{-1}$  con  $Q$  una matriz inversible y

$D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ .

Pues, si  $A = Q D Q^{-1}$ :

$$A^2 = A \cdot A = Q D (Q^{-1} Q) D Q^{-1} = Q D^2 Q^{-1}$$

$$A^3 = A \cdot A \cdot A = Q D Q^{-1} Q D Q^{-1} Q D Q^{-1}$$

$$A^3 = A \cdot A \cdot A = Q D (Q^{-1} Q) D (Q^{-1} Q) D Q^{-1} = Q D^3 Q^{-1}$$

En general entonces, si  $n \in \mathbb{N}$ :

$$A = Q D Q^{-1} \implies A^n = Q D^n Q^{-1}$$

Veamos entonces qué relación tiene que existir entre la matriz  $A$ , la matriz  $Q$  y la matriz  $D$  para que esto sea posible.

Sean  $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ ,  $Q \in \mathbb{K}^{n \times n}$  es una matriz inversible y  $D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^{n \times n}$ .

Vamos a explicitar las columnas de la matriz  $Q$ :

$Q = [V_1 | V_2 | \dots | V_n]$ ,  $V_i \in \mathbb{K}^{n \times 1}$ .

Entonces:

$$A = Q D Q^{-1} \iff A Q = Q D$$

Veamos entonces qué relación tiene que existir entre la matriz  $A$ , la matriz  $Q$  y la matriz  $D$  para que esto sea posible.

Sean  $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ ,  $Q \in \mathbb{K}^{n \times n}$  es una matriz inversible y  $D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^{n \times n}$ .

Vamos a explicitar las columnas de la matriz  $Q$ :

$Q = [V_1 | V_2 | \dots | V_n]$ ,  $V_i \in \mathbb{K}^{n \times 1}$ .

Entonces:

$$A = Q D Q^{-1} \iff A Q = Q D$$

$$A[V_1 | V_2 | \dots | V_n] = [V_1 | V_2 | \dots | V_n] \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & \vdots & \lambda_n \end{bmatrix} \quad (1)$$

Ahora sólo tenemos que recordar que en el producto de dos matrices  $Col_i(A B) = A Col_i(B)$ , para cada  $i$ .

Entonces si en (1), igualando columna por columna, tenemos:

$$A Col_1(Q) = A V_1 = [V_1 | V_2 | \dots | V_n] Col_1(D) = [V_1 | V_2 | \dots | V_n] \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$A V_1 = [V_1 | V_2 | \dots | V_n] \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = \lambda_1 V_1$$

Si repetimos esto para cada columna tendremos:

$$A \text{Col}_i(Q) = A V_i = [V_1 | V_2 | \dots | V_n] \text{Col}_i(D) = [V_1 | V_2 | \dots | V_n] \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ \lambda_i \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$A V_i = \lambda_i V_i$$

entonces hemos encontrado la relación que tienen que cumplir las matrices  $Q$  y  $D$  para que  $A = Q D Q^{-1}$

$$A = Q D Q^{-1} \Leftrightarrow A V_i = \lambda_i V_i, \text{ donde } V_i = \text{Col}_i(Q) \quad (2)$$

Entonces, otra vez aparece esta relación entre la matriz  $A$ , un vector de  $\mathbb{K}^n$  y un escalar.

Definición: Sea  $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ , un **autovalor** de  $A$  es un escalar  $\lambda \in \mathbb{K}$  tal que existe  $v \in \mathbb{K}^n$ ,  $v \neq 0$  que cumple  $Av = \lambda v$ .  
Se dice que  $v$  es **autovector** de  $A$ .

**Calculo de autovalores y autovectores** La primera pregunta entonces es cómo encontramos los autovalores y autovectores de una matriz  $A$ . Si  $\lambda \in \mathbb{K}$  es autovalor de  $A$ , por definición existe  $v \neq 0_{\mathbb{K}^n}$  tal que  $Av = \lambda v$

$$Av = \lambda v \Leftrightarrow (\lambda v - Av) = 0_{\mathbb{K}^n} \text{ y } v \neq 0_{\mathbb{K}^n}.$$

$$(\lambda I - A)v = 0_{\mathbb{K}^n} \text{ y } v \neq 0_{\mathbb{K}^n}.$$

Esto quiere decir que el sistema lineal homogéneo:

$(\lambda I - A)X = 0_{\mathbb{K}^n}$  tiene infinitas soluciones pues sabemos que hay una solución que es no trivial.

Entonces,  $\lambda \in \mathbb{K}$  es autovalor de  $A \Leftrightarrow (\lambda I - A)$  no es inversible  $\Leftrightarrow \Leftrightarrow \det(\lambda I - A) = 0$ .

Además,  $v$  es autovector de  $A$  asociado al autovalor

$$\lambda \Leftrightarrow (\lambda I - A)v = 0_{\mathbb{K}^n}$$

Cálculo de autovalores y autovectores para  $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$ :

- ▶ Buscamos  $\lambda \in \mathbb{K}$  tal que  $\det(\lambda I - A) = 0$ .
- ▶ Para cada  $\lambda$ , los autovectores de  $A$  asociados a  $\lambda$  son  $v \neq 0_{\mathbb{K}^n} / (\lambda I - A)v = 0_{\mathbb{K}^n} \Leftrightarrow v \in \text{Nul}(\lambda I - A)$ .

- ▶ Con la definición dada el resultado de (2), se puede enunciar diciendo :

**$A = Q D Q^{-1}$  si cada columna de  $Q$  es un autovector de  $A$  asociado al autovalor  $\lambda$ , correspondiente en la matriz diagonal  $D$ , además  $Q$  inversible implica que existe una base de  $\mathbb{K}^n$  formada por autovectores de  $A$ .**

- ▶ El conjunto de autovectores de  $A$  asociados a cada autovalor  $\lambda_0$  son los vectores no nulos, solución del sistema homogéneo  $(\lambda_0 I - A)X = 0_{\mathbb{K}^n}$ . Se llama **Autoespacio de  $A$  asociado a  $\lambda_0$**  al subespacio  $\text{Nul}(\lambda_0 I - A)$  y se nota:

$$S_{\lambda=\lambda_0} = \{v \in \mathbb{K}^n / Av = \lambda_0 v.\}$$

$$S_{\lambda=\lambda_0} = \{\text{autovectores de } A \text{ asociados a } \lambda_0\} \cup \{0_{\mathbb{K}^n}\}$$

Ejemplo: Dadas las siguientes matrices en  $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ :

$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ ,  $A_2 = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$ ,  $A_3 = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ . Encuentre autovalores y autovectores. ¿Alguna de ellas puede *factorizarse* en la forma  $Q D Q^{-1}$ ?

Resolución:

Para  $A_1$ :

Para encontrar sus autovalores, buscamos  $\lambda \in \mathbb{R}$ , tal que  $\det(\lambda I - A_1) = 0$ .

$$\det(\lambda I - A_1) = \begin{vmatrix} (\lambda - 1) & -1 \\ -1 & (\lambda - 1) \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (\lambda - 1)^2 = 1 \Leftrightarrow |\lambda - 1| = 1 \Leftrightarrow \lambda - 1 = 1 \text{ o } \lambda - 1 = -1.$$

$$\lambda = 2 \text{ o } \lambda = 0$$

Busquemos ahora los autovectores asociados a cada uno de estos autovalores.

Para encontrar los autovectores asociados a  $\lambda = 2$  buscamos el conjunto de las soluciones del sistema homogéneo determinado por la matriz que queda de reemplazar  $\lambda$  por 2 en  $(\lambda I - A_1)$ .

$S_{\lambda=2} = \text{Nul}(2I - A_1)$ . o sea las soluciones del sistema homogéneo determinado por la matriz que queda al reemplazar  $\lambda$  por 2 en  $(\lambda I - A_1)$ .

$$S_{\lambda=2}: \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{F_2+F_1} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow x_1 = x_2. \quad S_{\lambda=2} = \text{gen}\{[1 \ 1]^T\}$$

Busquemos ahora  $S_{\lambda=0}$ . Otra vez, tenemos que buscar las soluciones de un sistema homogéneo que, en este caso, queda definido por la matriz:

$$\begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \Rightarrow x_1 = -x_2, \quad S_{\lambda=0} = \text{gen}\{[-1 \ 1]^T\}.$$

Para contestar si existen  $Q$ , matriz inversible y  $D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2)$  tal que  $A_1 = Q D Q^{-1}$  sólo tenemos que recordar que para que esto sea posible las columnas de  $Q$  deben ser autovectores de  $A$ , obviamente l.i. pues  $Q$  debe ser una matriz inversible,  $\text{rg}(Q)=2$ ). En este caso vemos que esto es posible pues, por ejemplo, los vectores  $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$  y  $\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$  son autovectores de  $A$  linealmente independientes, el primero asociado al autovalor  $\lambda_1 = 2$  y el segundo asociado a  $\lambda_2 = 0$ , entonces si construimos las matrices:

$Q = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$  y  $D = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ , se cumple que:

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

**Obviamente, esta factorización no es única.**

Para  $A_2$ .

Como antes buscamos sus autovalores:  $\lambda \in \mathbb{R}$ , tal que  $\det(\lambda I - A_2) = 0$ .

$$\det(\lambda I - A_2) = \begin{vmatrix} (\lambda - 2) & -3 \\ 3 & (\lambda - 2) \end{vmatrix} = (\lambda - 2)^2 + 9 = 0 \Leftrightarrow$$

$\Leftrightarrow (\lambda - 2)^2 = -9$  (no tiene soluciones reales).

$(\lambda - 2)^2 = -9 \Leftrightarrow \lambda - 2 = 3i$  o  $\lambda - 2 = -3i$ .

$\lambda_1 = 2 + 3i$  y  $\lambda_2 = 2 - 3i \Rightarrow A$  no tiene autovalores reales.

Por lo tanto **no existen**  $Q$  y  $D$  en  $\mathbb{R}^{2 \times 2}$  tal que  $A = Q D Q^{-1}$ .

Para  $A_3$ .

Buscamos la ecuación que determina los autovalores  $\lambda \in \mathbb{R}$ , tal que  $\det(\lambda I - A_3) = 0$ .

$$\det(\lambda I - A_3) = \begin{vmatrix} (\lambda - 2) & -3 \\ 0 & (\lambda - 2) \end{vmatrix} = (\lambda - 2)^2 = 0 \Leftrightarrow \lambda = 2$$

En este caso obtuvimos un único autovalor, pues  $\lambda = 2$  es una raíz doble del polinomio anterior.

Busquemos los autovectores de  $A$  asociados a  $\lambda = 2$ :

Buscamos  $\text{Nul}(2I - A_3)$  :

$$S_{\lambda=2}: \begin{bmatrix} 0 & -3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow x_2 = 0 \quad S_{\lambda=2} = \text{gen}\{[1 \ 0]^T\}$$

Entonces, en este caso tampoco conseguimos *factorizar* la matriz  $A$  en la forma  $A = Q D Q^{-1}$  pues no existen dos autovectores l.i. para construir la matriz  $Q$ .

# Definiciones

En todo que sigue,  $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$

Se dice que  $A$  es **diagonalizable** si existe  $Q \in \mathbb{K}^{n \times n}$  invertible y  $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^{n \times n}$  tal que  $A = Q D Q^{-1}$ .

Por lo desarrollado al comienzo del episodio:

$A$  es diagonalizable  $\iff$  existe una base de  $K^n$  formada por autovectores de  $A$ .

Se llama **polinomio característico de  $A$** , al polinomio de grado  $n$ ,  $P_A(\lambda) = \det(\lambda I - A)$ .

*Los autovalores de  $A$  son las raíces de su polinomio característico.*

Si  $\lambda_0$  es autovalor de  $A$ , se llama **multiplicidad algebraica** de  $\lambda_0$ , a la multiplicidad de  $\lambda_0$  como raíz del polinomio característico. (Se nota:  $m_\lambda$ .)

Recordemos:  $\lambda_0$  es una raíz de multiplicidad  $m$  de  $P$ , si  $P(\lambda) = (\lambda - \lambda_0)^m Q(\lambda)$ , con  $Q(\lambda_0) \neq 0$ .

Si  $\lambda_0$  es autovalor de  $A$ , se llama **multiplicidad geométrica** de  $\lambda_0$ , a la dimensión de su autoespacio asociado. Notamos:  $\mu_\lambda = \dim(\text{Nul}(\lambda_0 I - A))$ .

## Observaciones

- Si  $\lambda_0 \in \mathbb{K}$  es autovalor de  $A \Rightarrow \mu_\lambda \geq 1$ .  
(Trivial por definición de autovalor y autovector)
- Si  $\lambda = 0$  es autovalor de  $A \Rightarrow S_{\lambda=0} = \text{Nul}(A)$ .  
Es inmediato pues  $S_{\lambda=0} = \text{Nul}(0I - A) = \text{Nul}(-A) = \text{Nul}(A)$ .
- Si  $A$  es inversible  $\lambda \neq 0, \forall \lambda$  autovalor de  $A$ .  
Pues  $A$  es inversible  $\Leftrightarrow \text{rg}(A) = n \Leftrightarrow \dim(\text{Nul}(A)) = 0 \Leftrightarrow \lambda = 0$  no es autovalor de  $A$ .
- Sea  $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$  un conjunto de autovectores de  $A$  asociados respectivamente a los autovalores  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ , tal que  $(\lambda_i \neq \lambda_j \forall i \neq j) \Rightarrow \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$  es l.i.

### Demostración:

Vamos a demostrarlo por el ABSURDO.

Supongamos que el conjunto  $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$  no es l.i.  $\Rightarrow$  será l.d.

Por el lema demostrado en el **Episodio 3.** de espacios vectoriales, sabemos que si el conjunto  $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$  es l.d, existe un primer vector  $v_m$ ,  $1 < m \leq m$  de manera tal que  $\{v_1, v_2, \dots, v_{m-1}\}$  es l.i. y  $\{v_1, v_2, \dots, v_{m-1}, v_m\}$  es l.d. (Sabemos que  $m > 1$  pues  $\{v_1\}$  es l.d. sólo si  $v_1 = 0_{\mathbb{K}^n}$  y esto es absurdo pues  $v_1$  es autovector de  $A$ , por lo tanto  $v_1 \neq 0_{\mathbb{K}^n}$ ) Esto quiere decir que existen  $\alpha_1, \dots, \alpha_{m-1} \in \mathbb{K}$  tal que:

$$v_m = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_{m-1} v_{m-1}. \quad (3)$$

$$Av_m = A(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_{m-1} v_{m-1}).$$

$$Av_m = \alpha_1 Av_1 + \alpha_2 Av_2 + \dots + \alpha_{m-1} Av_{m-1}.$$

$$\lambda_m v_m = \alpha_1 \lambda_1 v_1 + \alpha_2 \lambda_2 v_2 + \dots + \alpha_{m-1} \lambda_{m-1} v_{m-1}. \quad (4)$$

Si en (3), multiplicamos ambos miembros por  $\lambda_m$ , obtenemos:

$$\lambda_m v_m = \lambda_m \alpha_1 v_1 + \lambda_m \alpha_2 v_2 + \cdots + \lambda_m \alpha_{m-1} v_{m-1}. \quad (5)$$

Igualamos (4) y (5):

$$\alpha_1 \lambda_1 v_1 + \alpha_2 \lambda_2 v_2 + \cdots + \alpha_{m-1} \lambda_{m-1} v_{m-1} = \lambda_m \alpha_1 v_1 + \lambda_m \alpha_2 v_2 + \cdots + \lambda_m \alpha_{m-1} v_{m-1}$$

$$\alpha_1 (\lambda_1 - \lambda_m) v_1 + \alpha_2 (\lambda_2 - \lambda_m) v_2 + \cdots + \alpha_{m-1} (\lambda_{m-1} - \lambda_m) v_{m-1} = 0_{\mathbb{K}^n}$$

Como  $\{v_1, v_2, \dots, v_{m-1}\}$  es un conjunto l.i. los escalares de esta última combinación lineal deben ser todos nulos:

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha_1 \underbrace{(\lambda_1 - \lambda_m)}_{\neq 0} = 0 \\ \alpha_2 \underbrace{(\lambda_2 - \lambda_m)}_{\neq 0} = 0 \\ \vdots \\ \alpha_{m-1} \underbrace{(\lambda_{m-1} - \lambda_m)}_{\neq 0} = 0 \end{array} \right.$$

Luego:

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_{m-1} = 0 \Rightarrow v_m = 0_{\mathbb{K}^m}$$

ABSURDO, pues  $v_m \neq 0_{\mathbb{K}^m}$  por ser un autovector de  $A$ . El absurdo proviene de suponer que  $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$  es l.d.

Entonces  $\{v_1, \dots, v_k\}$  es l.i.

**A autovalores distintos corresponden autovectores l.i.**

Ya tenemos un resultado importante:

Si una matriz  $A \in \mathbb{K}^{n \times n}$  tiene  $n$  autovalores distintos en  $\mathbb{K} \Rightarrow A$  es diagonalizable.

Pues, como acabamos de demostrar, si  $A$  tiene  $n$  autovalores distintos, a autovalores distintos corresponden autovectores linealmente independientes, entonces existen  $n$  autovectores l.i. que formaran una base de  $K^n$ . Entonces podremos construir matrices  $Q$  y  $D$  tales que  $A = Q D Q^{-1}$ . ✓

Propiedades sobre autovalores de  $A \in K^{n \times n}$  (para la práctica):

- ▶  $\det(A) = \prod_{i=1}^n \lambda_i$ . (Se consideran los autovalores con repetición.)
- ▶  $\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i$ . (Se consideran los autovalores con repetición.)
- ▶ Si  $\lambda$  autovalor de  $A$  asociado al autovector  $v$ :
  - ▶  $(\lambda^k + t)$  es autovalor de  $(A^k + tI)$  asociado al autovector  $v$ .
  - ▶ Si  $A$  es inversible  $\Rightarrow \frac{1}{\lambda}$  de  $A^{-1}$  asociado al autovector  $v$ .
- ▶ Si  $\lambda$  autovalor de  $A \Rightarrow \lambda$  es autovalor de  $A^T$ . (Los autovectores no tienen porque ser los mismos.)

Entonces nos queda por responder qué pasa si  $A$ , no tiene a autovalores distintos. Eso significa que el polinomio característico tiene raíces de multiplicidad mayor que 1.

Ejemplo:

Sean  $A = \begin{bmatrix} 5 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$  y  $B = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$  matrices en  $\mathbb{C}^{3 \times 3}$ . ¿Son diagonalizables  $A$  y  $B$  ?

[Resolución:](#)

Empecemos estudiando la matriz  $A$ :

$$P_A(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} (\lambda - 5) & -1 & 0 \\ 0 & (\lambda - 5) & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda + 1) \end{vmatrix} = (\lambda + 1)(\lambda - 5)^2$$

Los autovalores de  $A$  son  $\lambda_1 = -1$ , de multiplicidad algebraica  $m_{\lambda_1} = 1$  y  $\lambda_2 = 5$ , de multiplicidad algebraica  $m_{\lambda_2} = 2$ .

Busquemos sus autovectores.

$$\lambda_1 = -1$$

$S_{\lambda=-1}$  queda determinado por la matriz del sistema homogéneo:

$$\begin{bmatrix} -6 & -1 & 0 \\ 0 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow x_2 = 0 = x_1 \Rightarrow S_{\lambda=-1} = \text{gen} \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

$$\lambda_2 = 5$$

$S_{\lambda=5}$  queda determinado por la matriz del sistema homogéneo:

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix} \Rightarrow x_3 = 0 \text{ y } x_2 = 0 \Rightarrow S_{\lambda=5} = \text{gen} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

Entonces, la matriz  $A$  **no es diagonalizable** pues sólo podemos conseguir dos direcciones linealmente independientes definidas por sus autovectores. No existe una base de  $\mathbb{C}^3$  formada por autovectores de  $A$ .

Repetamos el estudio para la matriz  $B$ :

$$P_B(\lambda) = \det(\lambda I - B) = \begin{vmatrix} (\lambda - 2) & -3 & 0 \\ -3 & (\lambda - 2) & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda - 5) \end{vmatrix}$$

$$P_B(\lambda) = (\lambda - 5)[(\lambda - 2)^2 - 9] = (\lambda - 5)((\lambda - 2) - 3)((\lambda - 2) + 3)$$

$$P_B(\lambda) = (\lambda + 1)(\lambda - 5)^2$$

Los autovalores de  $B$  son  $\lambda_1 = -1$ , de multiplicidad algebraica  $m_{\lambda_1} = 1$  y  $\lambda_2 = 5$ , de multiplicidad algebraica  $m_{\lambda_2} = 2$ .

Busquemos sus autovectores.

$$\lambda_1 = -1$$

$S_{\lambda=-1}$  queda determinado por la matriz del sistema homogéneo:

$$\begin{bmatrix} -3 & -3 & 0 \\ -3 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -6 \end{bmatrix} \Rightarrow x_3 = 0, \text{ y } x_1 + x_2 = 0 \Rightarrow x_2 = -x_1 \Rightarrow$$

$$S_{\lambda=-1} = \text{gen} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}.$$

$$\lambda_2 = 5$$

$S_{\lambda=5}$  queda determinado por la matriz del sistema homogéneo:

$$\begin{bmatrix} 3 & -3 & 0 \\ -3 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow x_1 = x_2, x_3 \in \mathbb{R} \Rightarrow S_{\lambda=5} = \text{gen} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

Entonces la matriz  $B$  es **diagonalizable** pues existe una base de  $\mathbb{C}^3$  formada por autovectores de  $B$ . Por ejemplo:

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

Podemos construir  $Q = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$  y  $D = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$ .

Y entonces se cumple que:

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1}$$



## Semejanza de matrices

Definición: Sean  $A$  y  $B$  dos matrices en  $\mathbb{K}^{n \times n}$ , se dice que  $B$  es **semejante** a  $A$  si existe  $Q \in \mathbb{K}^{n \times n}$  inversible, tal que  $B = Q A Q^{-1}$ .

Se nota:  $B \sim A$ .

Algunas consideraciones inmediatas:

- ▶ Con esta definición, las **matrices diagonalizables** son **matrices semejantes a una matriz diagonal**.
- ▶ La relación de semejanza es **reflexiva**,  $A \sim A$  pues  $A = I A I$  y también **simétrica** pues  $B \sim A \Leftrightarrow \exists Q$  tal que  $B = Q A Q^{-1} \Leftrightarrow Q^{-1} B Q = A \Rightarrow A \sim B$ .

- ▶ La relación de semejanza es **transitiva**:

Si  $B \sim A$  y  $C \sim B \Rightarrow C \sim A$ .

Aplicando la definición,  $B \sim A \Leftrightarrow B = Q A Q^{-1}$  y  $C \sim B \Leftrightarrow C = H B H^{-1} = H Q A Q^{-1} H^{-1} = (H Q) A \underbrace{(Q^{-1} H^{-1})}_{(H Q)^{-1}}$ .

$$C = (H Q) A (H Q)^{-1} \Rightarrow C \sim A. \checkmark$$

- ▶ Si  $\mathbb{V}$  es un espacio vectorial de dimensión  $n$  y  $B$  y  $B'$  son bases de  $\mathbb{V}$ , para toda t.l.  $T : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}$  se cumple que  $[T]_{B'}^{B'} = M_{B'}^{B'} [T]_B^B M_{B'}^B = M_{B'}^{B'} [T]_B^B (M_{B'}^B)^{-1}$

**Todas las representaciones matriciales de  $T$  con respecto a una misma base son semejantes entre sí.**

- Si  $B \sim A \Rightarrow A$  y  $B$  tienen los mismos autovalores con la misma multiplicidad algebraica y geométrica.

Demostración:

- a.  $B \sim A \Leftrightarrow B = Q A Q^{-1}$ , entonces

$$P_B(\lambda) = \det(\lambda I - B) = \det(\lambda I - Q A Q^{-1})$$

$$P_B(\lambda) = \det(\lambda Q Q^{-1} - Q A Q^{-1}) = \det(Q(\lambda I - A)Q^{-1})$$

$$P_B(\lambda) = \det(Q)\det(\lambda I - A)\det(Q^{-1})$$

$$P_B(\lambda) = \det(\lambda I - A) = P_A(\lambda)$$

Como  $A$  y  $B$  tienen el mismo polinomio característico entonces tienen los mismos autovalores con la misma multiplicidad algebraica.

- b. Sea  $\lambda_0$  autovalor de las matrices semejantes  $A$  y  $B$ , por cada  $v_0$  autovector de  $A$  asociado al autovalor  $\lambda_0$ ,  $w_0 = Qv_0$  es autovector de  $B$  asociado a  $\lambda_0$  y viceversa, por cada  $w_0$  autovector de  $B$  asociado a  $\lambda_0$  el vector  $Q^{-1}w_0$  es autovector de  $A$  asociado a  $\lambda_0$ .

Si  $v_0$  es autovector de  $A$  asociado a  $\lambda_0 \Rightarrow Av_0 = \lambda_0 v_0$ .

Como  $B = Q A Q^{-1} \Rightarrow B Q = Q A \Rightarrow B Q v_0 = Q A v_0 \Rightarrow B (Q v_0) = Q (\lambda_0 v_0) = \lambda_0 (Q v_0) \Rightarrow Q v_0$  es autovector de  $B$  asociado al autovalor  $\lambda_0$ . De la misma manera, si suponemos  $w_0$  autovector de  $B$  asociado a  $\lambda_0$  tenemos que

$$B w_0 = Q A Q^{-1} w_0$$

$$\lambda_0 w_0 = Q A Q^{-1} w_0 \Rightarrow Q^{-1}(\lambda_0 w_0) = A (Q^{-1} w_0)$$

$$A (Q^{-1} w_0) = \lambda_0 (Q^{-1} w_0)$$

Por definición de autovector ( $Q^{-1} w_0$ ) es autovector de  $A$  asociado a  $\lambda_0$ . Por lo tanto hemos demostrado que la correspondencia de autovectores de  $A$  asociados a  $\lambda_0$  es uno a uno con los autovectores de  $B$  asociados a  $\lambda_0$ , entonces la dimensión de los respectivos autoespacios es igual. Por lo tanto la multiplicidad geométrica de  $\lambda_0$  como autovalor de  $A$  es igual a la multiplicidad geométrica de  $\lambda_0$  como autovalor de  $B$ .

Vamos a demostrar ahora que si  $\lambda_0$  es autovalor de  $A$  siempre se cumple que su multiplicidad algebraica,  $m_{\lambda_0}$ , es mayor igual que su multiplicidad geométrica,  $\mu_{\lambda_0}$ .

Si  $\lambda_0$  es autovalor de  $A \Rightarrow \boxed{\mu_{\lambda_0} \leq m_{\lambda_0}}$ .

### Demostración:

Sea  $A$  matriz de  $n \times n$ , y supongamos  $\lambda_0$  autovalor de  $A$  con multiplicidad algebraica,  $m_{\lambda_0} = m$  y multiplicidad geométrica,  $\mu_{\lambda_0} = k$ .

Como  $m_{\lambda_0} = m \Rightarrow P(\lambda) = (\lambda - \lambda_0)^m Q(\lambda)$ ,  $Q(\lambda_0) \neq 0$ .

Como  $\mu_{\lambda_0} = k = \dim(S_{\lambda_0})$  entonces existe una base de  $S_{\lambda_0}$ ,

$B_{S_{\lambda_0}} = \{v_1, \dots, v_k\}$ , podemos extender esta base a una base de todo el espacio  $\mathbb{K}^n$ ,  $B = \{v_1, \dots, v_k, v_{k+1}, \dots, v_n\}$ . Sea

$Q = [v_1 | \dots | v_k | v_{k+1} | \dots | v_n]$ , claramente  $Q$  es inversible pues sus columnas forman una base de  $\mathbb{K}^n$ .

Calculemos

$$AQ = A[v_1 | \dots | v_k | v_{k+1} | \dots | v_n]$$

Si explicitamos este producto columna a columna:

$$AQ = [Av_1 | \dots | Av_k | Av_{k+1} | \dots | Av_n]$$

Reemplazamos  $Av_i = \lambda_0 v_i$ , para cada  $i = 1, \dots, k$ .

$$AQ = [\lambda_0 v_1 | \dots | \lambda_0 v_k | w_1 | \dots | w_{n-k}]$$

Si ahora multiplicamos por  $Q^{-1}$  m. a m, tenemos:

$$Q^{-1}AQ = Q^{-1}[\lambda_0 v_1 | \lambda_0 v_2 | \dots | \lambda_0 v_k | w_1 | \dots | w_{n-k}]$$

Como  $Q^{-1}Q = I \Rightarrow Q^{-1}v_i = e_i$ , entonces:

$$Q^{-1}AQ = [\lambda_0 Q^{-1}v_1 | \dots | \lambda_0 Q^{-1}v_k | Q^{-1}w_1 | \dots | Q^{-1}w_{n-k}]$$

$$Q^{-1}A Q = [\lambda_0 e_1 | \dots | \lambda_0 e_k | u_1 | \dots | u_{n-k}]$$

Conocemos algunas características del aspecto de esta matriz:

$$Q^{-1}A Q = \begin{bmatrix} \lambda_0 & 0 & \dots & 0 & * & \dots & * \\ 0 & \lambda_0 & \dots & 0 & * & \dots & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_0 & * & \dots & * \\ 0 & 0 & \dots & 0 & * & \dots & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & * & \dots & * \end{bmatrix}$$

Podemos expresar por bloques esta matriz de  $n \times n$ :

$$Q^{-1}A Q = \left[ \begin{array}{c|c} \lambda_0 I_k & B \\ \hline 0 & E \end{array} \right]$$

Donde  $B$  es una matriz de  $(k \times (n - k))$ ,  $E$  es una matriz de

$(n - k) \times (n - k)$   $A$  es semejante a la matriz  $H = \left[ \begin{array}{c|c} \lambda_0 I_k & B \\ \hline 0 & E \end{array} \right]$ ,

pues cumple con la definición. Y por lo visto, sabemos que :

$$P_A(\lambda) = P_H(\lambda) \quad (6)$$

Veamos entonces qué podemos anticipar sobre el polinomio característico de  $H$ .

$$P_H(\lambda) = \det \left( \lambda \left[ \begin{array}{c|c} I_k & 0 \\ \hline 0 & I_{n-k} \end{array} \right] - \left[ \begin{array}{c|c} \lambda_0 I_k & B \\ \hline 0 & E \end{array} \right] \right)$$



Entonces, de la igualdad (7):

$$(\lambda - \lambda_0)^m Q(\lambda) = (\lambda - \lambda_0)^k R(\lambda)$$

Entonces  $(\lambda - \lambda_0)^k$ , divide a la expresión que está a la izquierda de la igualdad:

$(\lambda - \lambda_0)^k$  divide a  $(\lambda - \lambda_0)^m Q(\lambda)$

y como  $(\lambda - \lambda_0)$  no divide a  $Q \Rightarrow (\lambda - \lambda_0)^k$  divide a  $(\lambda - \lambda_0)^m$

Entonces:  $k \leq m$ .

O sea para cada autovalor de  $A$  se cumple:

$$\mu_\lambda = \text{multip. geométrica} \leq m_\lambda = \text{multip. algebraica.} \checkmark$$

Volvamos al problema de encontrar una **condición necesaria y suficiente** para poder asegurar que una matriz de  $A \in K^{n \times n}$  es diagonalizable.

- ▶ Para poder asegurar que una matriz  $A$  es diagonalizable, tenemos que poder afirmar que existe una base de autovectores de  $K^n$  formada por autovectores de  $A$ .
- ▶ Ya sabemos que a autovalores distintos corresponden autovectores linealmente independientes. Como acabamos de demostrar que la multip geométrica de un autovalor es siempre menor o igual que su multiplicidad algebraica, sabemos que si un autovalor es raíz simple del polinomio característico obtendremos como autoespacio asociado a él un subespacio de dimensión 1.

- ▶ Entonces para construir una base de autovectores asociados a una matriz  $A$ , tendrá que cumplirse que si algún autovalor tiene multiplicidad algebraica mayor que uno podamos encontrar asociados a él tantos autovectores l.i. como su multiplicidad algebraica, esto es lo mismo que pedir que la dimensión de su autoespacio asociado sea igual a su multiplicidad algebraica. O sea se debe cumplir que **multiplicidad algebraica = multiplicidad geométrica** para cada autovalor de  $A$ .

Ejemplo:

Dada en  $\mathbb{R}^{3 \times 3}$  la matriz  $A = \begin{bmatrix} 2 & (\alpha - 2) & 0 \\ 0 & (\alpha + 2) & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$  con  $\alpha \in \mathbb{R}$ . Hallar

todos los  $\alpha \in \mathbb{R}$  para los cuales  $A$  resulta diagonalizable.

Resolución:

Empezamos, como siempre por calcular los autovalores de la matriz:

$$P_A(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} (\lambda - 2) & (-\alpha + 2) & 0 \\ 0 & (\lambda - \alpha - 2) & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda - 3) \end{vmatrix}$$

$$P_A(\lambda) = (\lambda - 3)(\lambda - 2)(\lambda - \alpha - 2) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \lambda = 3, \text{ o } \lambda = 2, \text{ o } \lambda = \alpha + 2.$$

Si  $\alpha + 2 \neq 3$  y  $\alpha + 2 \neq 2 \Rightarrow A$  tendrá tres autovalores distintos y , como a autovalores distintos corresponden autovectores l.i, la matriz resultará diagonalizable.

O sea ya sabemos qué pasa si  $\alpha \neq 1$  y  $\alpha \neq 0$ .  
Podemos asegurar que:

Si  $\alpha \in \mathbb{R} - \{0, 1\} \Rightarrow A$  resulta diagonalizable.

Ahora entonces, tenemos que ver qué sucede si  $\alpha = 0$  o  $\alpha = 1$ .

$\alpha = 0$

Si  $\alpha = 0 \Rightarrow$  ya sabemos que los autovalores de  $A$  serán  $\lambda_1 = 2$  autovalor de multiplicidad algebraica 2 y  $\lambda_2 = 3$  autovalor de multiplicidad 1.

Para saber si la matriz  $A$  resulta diagonalizable basta con calcular la multiplicidad geométrica de  $\lambda_1 = 2$ . Si su multiplicidad geométrica coincide con la algebraica será diagonalizable y sino no.

El autoespacio asociado a  $\lambda_1 = 2$  es el subespacio de las soluciones del sistema homogéneo determinado por la matriz  $2I - A$ :

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \Rightarrow x_3 = 0 \text{ y } x_2 = 0 \Rightarrow \dim(S_{\lambda = 2}) = 1 \neq 2 =$$

Entonces si  $\alpha = 0$  la matriz  $A$  **no es diagonalizable** pues la multiplicidad algebraica  $\neq$  multiplicidad geométrica para  $\lambda = 2$ .

$$\alpha = 1$$

Si  $\alpha = 1$  ya sabemos que los autovalores de  $A$  serán  $\lambda_1 = 2$  de multiplicidad algebraica 1 y  $\lambda_2 = 3$  de multiplicidad algebraica 2. Entonces, para saber si  $A$  es diagonalizable tenemos que chequear si coinciden la multiplicidad algebraica con la multiplicidad geométrica en este caso.

Analizamos las ecuaciones que definen al autoespacio  $S_{\lambda=3}$  :

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La matriz tiene rango 1, así que su nulo tiene dimensión 2.

Entonces para  $\lambda = 3$ , en este caso, la multiplicidad geométrica = multiplicidad algebraica. Concluimos entonces que  $A$  es diagonalizable si  $\alpha = 1$ .

Entonces:  **$A$  es diagonalizable  $\forall \alpha \in \mathbb{R} - \{0\}$**

---

Definición: Un subespacio  $S \subseteq \mathbb{K}^n$  es un **subespacio invariante** de  $A$  (o **A-invariante**) si para todo vector  $v \in S$  se cumple que  $Av \in S$ .

### Comentarios:

- Todo autoespacio de  $A$  es un subespacio A-invariante.
- La recíproca no es cierto por supuesto.  
Por ejemplo, tomemos la matriz  $B$  que analizamos en un ejemplo anterior.

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

$B$  es diagonalizable, sus autovalores son  $\lambda = 5$ , de multiplicidad algebraica y geométrica 2, y  $\lambda = -1$  autovalor simple.

$$S_{\lambda=5} = \text{gen} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

$$S_{\lambda=-1} = \text{gen} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}.$$

Claramente,  $S_{\lambda=5}$  y  $S_{\lambda=-1}$  son  $A$ -invariantes.

No son los únicos, tomemos por ejemplo el subespacio

$$S_1 = \text{gen} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\} \Rightarrow S_1 \text{ es } A\text{-invariante.}$$

$$\text{Pues si } v \in S_1, v = \alpha_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} + \alpha_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$Av = \alpha_1(-1) \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} + \alpha_2(5) \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \in S_1.$$

Definición: Un subespacio  $S \subseteq \mathbb{V}$  es un **subespacio invariante** de  $T : \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{V}$  transformación lineal (o **T-invariante**) si para todo vector  $v \in S$  se cumple que  $T(v) \in S$ .

### Comentarios:

- El núcleo de una transformación lineal  $T$  es un subespacio T-invariante.
- $\text{Im}(T)$  es un subespacio invariante de  $T$ .
- En toda rotación de un plano alrededor de un eje ortogonal a él, el plano es un subespacio T-invariante.