
Álgebra II (Primer cuatrimestre, 2020)
GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS N^o4
Primera parte (del 13/07/2020 al 17/07/2020). [En construcción]

Cuando podemos trasladar un problema práctico al lenguaje de la matemática, podemos, al mismo tiempo, “abstraernos” de las características secundarias del problema y, haciendo uso de fórmulas y teoremas generales, obtener resultados precisos. De este modo la abstracción de la matemática constituye su potencia; esta abstracción es una necesidad práctica.

A. N. KOLMOGOROV

EJERCICIOS


1. Sea $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ la matriz

$$A = \begin{bmatrix} -4 & -6 & 3 \\ 2 & 4 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \end{bmatrix}.$$

(a) Comprobar que 0, -1, y 2 son todos los autovalores de A , y encontrar autovectores asociados a cada uno de ellos.

(b) Verificar que esos autovectores forman una base \mathcal{B} de \mathbb{R}^3 .

(c) Hallar la matriz de cambio de coordenadas de la base \mathcal{B} en la base canónica \mathcal{E} , $P = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}}$, y comprobar, mediante multiplicación de matrices, que $A = P\Lambda P^{-1}$, donde $\Lambda = \text{diag}(0, -1, 2)$.

2.  En cada uno de los siguientes casos, hallar el polinomio característico de la matriz $A_i \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$, analizar si la misma es diagonalizable, y en caso de serlo hallar una matriz inversible $P_i \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ y una matriz diagonal $\Lambda_i \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ tales que $A_i = P_i \Lambda_i P_i^{-1}$:


$$A_1 = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, A_2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, A_3 = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, A_4 = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

¿Cómo se modifica el análisis precedente si se considera que las matrices A_i están en $\mathbb{C}^{2 \times 2}$?

: Obsérvese que para matrices A de 2×2 vale que


$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \lambda^2 - \text{tr}(A)\lambda + \det(A),$$

y en consecuencia, las raíces de $p(\lambda)$ son $\lambda_{\pm} = \frac{1}{2} \left(\text{tr}(A) \pm \sqrt{\text{tr}(A)^2 - 4 \det(A)} \right)$.

: Obsérvese también que para matrices A de 2×2 vale que $p(A) = 0$. (Este resultado, conocido como el Teorema de Cayley-Hamilton, vale en general, es decir para matrices A de $n \times n$.)

3. Explicar por qué las siguientes matrices no son diagonalizables en $\mathbb{R}^{2 \times 2}$:

$$\begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}, \lambda \in \mathbb{R}; \quad \rho \begin{bmatrix} \cos \theta & -\text{sen } \theta \\ \text{sen } \theta & \cos \theta \end{bmatrix}, \rho > 0, \theta \in \mathbb{R} \setminus \{k\pi : k \in \mathbb{Z}\}.$$

4.  Encontrar los autovalores de cada una de las siguientes matrices A_i , sus multiplicidades algebraicas y geométricas y tantos autovectores linealmente independientes como sea posible, siendo

$$A_1 = \begin{bmatrix} -3 & 1 & -3 \\ 20 & 3 & 10 \\ 2 & -2 & 4 \end{bmatrix}, A_2 = \begin{bmatrix} -4 & -3 & -3 \\ 0 & -1 & 0 \\ 6 & 6 & 5 \end{bmatrix}.$$

¿Se pueden hallar una matriz inversible $P_i \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ y una matriz diagonal $\Lambda_i \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ tales que $A_i = P_i \Lambda_i P_i^{-1}$?

↳: recordar el teorema de Gauss sobre la forma de las raíces racionales de un polinomio con coeficientes enteros y observar que, en este caso, sólo pueden ser los divisores enteros del $\det(A)$.

5. Sea \mathbb{V} un \mathbb{C} -espacio vectorial de dimensión $n > 1$. Explicar por qué

(a) si $S \in \mathcal{L}(\mathbb{V}) \setminus \{I_{\mathbb{V}}\}$ es una simetría (i.e., $S^2 = I_{\mathbb{V}}$), existen $k \in \mathbb{N}$ y una base \mathcal{B} de \mathbb{V} tales que

$$[S]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_k & 0 \\ 0 & -\mathbf{I}_{n-k} \end{bmatrix}$$

con \mathbf{I}_k la matriz identidad de $k \times k$ e \mathbf{I}_{n-k} la matriz identidad de $(n-k) \times (n-k)$;

(b) si $T \in \mathcal{L}(\mathbb{V}) \setminus \{0_{\mathbb{V}}, I_{\mathbb{V}}\}$ es una proyección (i.e., $T^2 = T$), existen $k \in \mathbb{N}$ y una base \mathcal{B} de \mathbb{V} tales que

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_k & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

con \mathbf{I}_k la matriz identidad de $k \times k$.

6. 🛑 Sea A una matriz de $n \times n$ que admite la partición en bloques

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix}$$

con A_{11} de $k \times k$, A_{12} de $k \times (n-k)$ y A_{22} de $(n-k) \times (n-k)$.

(a) Demostrar que el polinomio característico de A es el producto de los polinomios característicos de A_{11} y A_{22} .

(b) Demostrar que λ es autovalor de A si y sólo si λ es autovalor de A_{11} ó A_{22} .

(c) Si $A_{12} = 0$ ¿qué relación puede establecerse entre los autovectores de A_{11} y A_{22} y los autovectores de A ?

(d) Encontrar los autovalores de A , sus multiplicidades algebraicas y geométricas y tantos autovectores linealmente independientes como sea posible, siendo

$$A = \begin{bmatrix} -4 & -6 & 3 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

(e) Generalizar los incisos (a), (b) y (c) al caso en que la matriz A de $n \times n$ admite la siguiente partición en bloques

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1r} \\ 0 & A_{22} & \cdots & A_{2r} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_{rr} \end{bmatrix},$$


con $A_{11}, A_{22}, \dots, A_{rr}$ matrices cuadradas.

7. Sea $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ la matriz dependiente del parámetro real α :

$$A = \begin{bmatrix} 2\alpha + 4 & 1 - \alpha & -2\alpha - \alpha^2 \\ 0 & 4 - \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 4 - \alpha^2 \end{bmatrix}$$

(a) Obtener los valores de α para los que A es diagonalizable.

(b) Diagonalizar A para $\alpha = 1$ y para $\alpha = 2$.

8.  Sea $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ una matriz no diagonalizable. Demostrar que existe una matriz inversible P tal que $P^{-1}AP = J$, donde J tiene alguna de las siguientes formas

$$\begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \mu \end{bmatrix},$$

con $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ y $\lambda \neq \mu$.

9. Encontrar los autovalores de cada una de las siguientes matrices A_i , sus multiplicidades algebraicas y geométricas. En caso de que A_i no sea diagonalizable, hallar una matriz inversible P_i tal que $P_i^{-1}A_iP_i = J_i$, donde J_i tiene alguna de las formas del ejercicio anterior.

$$A_1 = \begin{bmatrix} -5 & 1 & -1 \\ 15 & 0 & 3 \\ 7 & -1 & 3 \end{bmatrix}, A_2 = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, A_3 = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 5 \\ -1 & -1 & 4 \end{bmatrix}.$$